



Le rut du Chevreuil a lieu en août, mais la gestation est différée et ne débute que 150 jours après l'accouplement. Ensuite, 144 jours sont nécessaires pour que la chevrette mette au monde deux jumeaux, voire un seul faon, mais très rarement trois. Au début de l'été suivant, on peut donc observer les faons issus de l'accouplement de l'année précédente. Ceux-ci restent bien souvent cachés dans les taillis, en sous-bois ou dans les herbes hautes.

Les foins restent au sol quelques jours de façon à sécher. Ils sont régulièrement retournés par l'exploitant agricole, à l'aide d'une faneuse. Ils sont ensuite disposés en andains avant d'être mis en bottes ou roulés en meules. Tandis que les renards profitent des rongeurs ainsi mis à découvert, les herbivores se délectent de la bonne herbe sèche.



Ce brocard a perçu le bruit de l'appareil photo venant d'une haie de genêts placée à bon vent ; il fait comprendre son désaccord... Le cri du Chevreuil est l'aboïement.

Les faons effarouchés par le bruit des machines sont sortis sur la route contiguë à la prairie. Lors des fenaisons, certains se font tuer par les faucheuses. Si la fauche commence par le centre des prairies, les jeunes seront rabattus vers l'extérieur et le drame pourra être évité.





Le Chat forestier affectionne aussi les prairies fraîchement fauchées, pour chasser.

